多発性骨髄腫

1.MPB療法　　1コース：42日　　総コース数：9コース

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | 1.3 mg/㎡ | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾒﾙﾌｧﾗﾝ(内服) | 6～8 mg/㎡/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(内服) | 40～60 mg/㎡/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.ERd療法　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1、2コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | 10 mg/kg | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | 6.6 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 28 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

〈3コース目以降〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | 10 mg/kg | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | 6.6 mg/日 | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 28 mg/日 | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 40 mg/日 | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | |

3.EPd療法　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1、2コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | 10 mg/kg | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | 6.6 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 4 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 28 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

〈3コース目以降〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | 20 mg/kg | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | 6.6 mg/日 | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 4 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 28 mg/日 | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 40 mg/日 | | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

4.DLd療法(皮下注)【未治療の場合】　　1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1～2コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 40 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

〈3～6コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 40 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

〈7コース目～〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 40 mg/日 | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

4.DLd療法(皮下注)【再発、難治例の場合】1コース：28日　　総コース数：規定なし

〈1～2コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 20 mg/日 | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | |

〈3～6コース目〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 20 mg/日 | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | |

〈7コース目～〉

| 薬品名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | 1800mg/15mL | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ(内服) | 25 mg/日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | |
| ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(内服) | 20 mg/日 | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | | ／ | ／ | | | | | |